

information

formation

recherche

coopération internationale

Rappel précoce suite à une mammographie de dépistage anormale, PQDCS, 1998-2000

Louise Rochette, Diane Major, André Langlois,
Éric Pelletier et Jacques Brisson,
Avec la collaboration de l'équipe d'évaluation du PQDCS

7 novembre 2005

Institut national
de santé publique
Québec

Problématique

Au début du programme un suivi à moins de deux ans était recommandé à « plusieurs » femmes après une mammographie anormale

2
05-11-07


Institut national
de santé publique
Québec

Objectifs

- Mesurer la fréquence d'une recommandation de rappel précoce
- Décrire les variations de la fréquence en fonction des caractéristiques des femmes et du type de lésion à la mammographie de dépistage
- Mesurer la compliance à une recommandation de rappel précoce
- Mesurer la fréquence des cancers parmi les femmes ayant eu une telle recommandation

3
05-11-07

Population à l'étude



4
05-11-07


Sources de données

- SI-PQDCS
- MED-ÉCHO
- RAMQ

5
05-11-07

Institut national
de santé publique
Québec 


Mammographies anormales bénignes selon le suivi recommandé



6
05-11-07

Caractéristiques des femmes


Mammographie antérieure



7
05-11


Caractéristiques des femmes

Densité mammaire




8
05-11

Type de lésions à la mammographie de dépistage




9
05-11

Dernier examen de l'investigation initiale



10
05-11

Compliance à la recommandation de suivi



11
05-11

Fréquence des cancers

Suivi recommandé	Nombre cancers / femmes	Pourcentage de cancers	IC - 95 %
Aucun	53 / 12 593	0,42	(0,31 ; 0,53)
3 à 11 mois	78 / 6 769	1,15	(0,90 ; 1,41)
<i>compliantes</i>	58 / 4 339	1,34	(0,99 ; 1,68)
<i>non-compliantes</i>	20 / 2 430	0,82	(0,46 ; 1,18)
12 à 17 mois	17 / 2 954	0,58	(0,30 ; 0,85)

12
05-11

Discussion

Rappels précoces / femmes dépistées

PQDCS : estimé à 3,2 %

Littérature :

- définitions et contextes différents
- < 0,1 % - 1,2 % (Royaume-Uni, Australie)
- 1,2 % - 6,5 % (États-Unis, Uruguay, Espagne)
- 5,2 % (États-Unis, incluant le rappel précoce après une mammographie normale)

Recommandations :

- Royaume-Uni : norme < 0,5 % ; souhaité < 0,25 %
- Europe : norme < 1 % ; souhaité 0

Discussion

Fréquence du cancer / rappels précoces

PQDCS : 1,15 %

Littérature :

- 0,3 % à 3,9 %

États-Unis (ACR) – Canada (guides de pratique) :

- risque de cancer < 2% pour les lésions probablement bénignes

Conclusion

- ❑ Fréquence des rappels précoces - PQDCS
 - semblable à la pratique nord-américaine
 - plus élevée qu'en Europe
- ❑ Fréquence du cancer parmi les rappels précoces
 - près de trois fois plus élevée comparativement aux femmes sans recommandation de suivi après une mammographie anormale
 - comparable à plusieurs études
 - fréquence attendue pour des lésions probablement bénignes

15
05-11-07

Institut national
de santé publique
Québec 

MERCI

16